

**Medication Deferral List**

**Lista de Medicamentos Aplazados**

**NO DEJE** de tomar los medicamentos recetados por su médico para donar sangre.

Donar mientras se toman estos medicamentos podría tener un efecto negativo en su salud o en la del receptor de su sangre.

**POR FAVOR, DÍGANOS SI:**

Está en tratamiento con alguno de los siguientes tipos de medicamentos:	o ha tomado:		que también se llama:	en cualquier momento de los últimos:	
<b>Agentes antiplaquetarios</b>  (generalmente se toma para prevenir un derrame cerebral o un ataque cardíaco)	Feldene		piroxicam	2 días	PLT
	Effient		prasugrel	3 días	PLT
	Brilinta		ticagrelor	7 días	PLT
	Plavix		clopidogrel	14 días	PLT
	Ticlid		ticlopidine		
	Zontivity		vorapaxar	1 mes	PLT
<b>Anticoagulantes o “diluyentes de la sangre”</b>  (generalmente se toman para prevenir coágulos de sangre en las piernas y los pulmones y para prevenir accidentes cerebrovasculares)	Arixtra		fondaparinux	2 días	
	Eliquis		apixaban		
	Fragmin		dalteparin		
	Lovenox		enoxaparin		
	Pradaxa		dabigatran		
	Savaysa		edoxaban		
	Xarelto		rivaroxaban		
	Coumadin, Warfilone, Jantoven		warfarin	7 días	
Heparina, heparina de bajo peso molecular					
<b>Tratamiento del acné</b>	Absorica Accutane Amnesteem Claravis	Myorisan Sotret Zenatane	Isotretinoin	1 mes	
<b>Mieloma múltiple</b>	Thalomid Revlimid		thalidomide lenalidomide		
<b>Artritis reumatoide</b>	Rinvoq		upadacitinib		
<b>Remedio contra la caída del cabello</b>	Propecia		finasteride		
<b>Síntomas de la próstata</b>	Proscar		finasteride		
	Avodart	Jalyn	dutasteride	6 meses	
<b>Inmunosupresor</b>	Cellcept		mycophenolate mofetil	6 semanas	
<b>Exposición a la hepatitis</b>	Inmunoglobulina contra la hepatitis B		HBIG	3 meses	
<b>Prevención del VIH</b>  (también conocidos como PrEP y PEP)	Cualquier medicamento que se tome por vía oral para prevenir el VIH	Truvada	emtricitabine y tenofovir disoproxil fumarate	3 meses	
		Descovy	emtricitabine y tenofovir alafenamide		
	Prevención del VIH mediante inyectables	Apretude Yeztugo	cabotegravir lenacapavir	2 años	
<b>Cáncer de piel de células basales</b>	Erivedge	Odomzo	vismodegib sonidegib	2 años	
<b>Esclerosis múltiple recurrente</b>	Aubagio		teriflunomide		
<b>Artritis reumatoide</b>	Arava		leflunomide		
<b>Medicamento experimental o vacuna no autorizada (experimental)</b>				12 meses	
<b>Soriasis</b>	Soriatane		acitretin	3 años	
	Tegison		Etretinate	Alguna vez	
<b>Tratamiento del VIH</b>	Cualquier medicamento para tratar el VIH. También puede llamarse terapia antirretroviral (TAR).			Alguna vez	
<b>Insulina</b>				Actualmente	
<b>Medicamentos anticonvulsivos o antiepilépticos: medicamentos como los que se muestran; es posible que sea necesario postergar el uso del medicamento en caso de convulsiones, no del medicamento en sí.</b>	Tegretol		carbamazepine phenytoin	El aplazamiento puede ser de hasta 1 año	
	Dilantin				
	Aptiom				
<b>Antiinflamatorios esteroideos</b>	Esteroides		cortisona prednisona	4 días (por vía oral o inyección)	
<b>Prevención de coágulos sanguíneos o accidentes cerebrovasculares</b>	Pletal		cilostazol	5 días	PLT
<b>Inyección para enfermedades autoinmunes</b>	Inyección de Enbrel con metotrexato			7 días	